

Deckel in Bezug Gewitterbildung

Bei Gewittern ist häufig die Rede von gedeckelten Luftmassen.

Gewitterbildung erfolgt bei labiler [Luftschichtung](#). Labil bedeutet hier, daß ein Luftpaket nach oben steigt und durch die Druckabnahme ausdehnt und abkühlt. Es bleibt dabei wärmer als seine Umgebung. Gewitterbildung erfordert eine hochreichende labile Schichtung, das Luftpaket vom Boden also bis in Höhen aufsteigt in denen es bereits deutlich negative Temperaturen erhält.

Hier muss man den Unterschied zwischen der Grundsicht und der freien [Atmosphäre](#) kennen. Die Grundsicht sind die untersten 1000 bis 1500 m Luftschicht, die direkt mit dem Erdboden in Kontakt ist. Hier tritt die Reibung auf, hier wird die Temperatur durch die Verhältnisse am Boden direkt bestimmt, über kühlen Meer ist die [Luftmasse](#) der Grundsicht immer kühl. Die [Luft](#) innerhalb der Grundsicht tagsüber, außer im Winter bei Wind von Land, immer trocken- und/oder feuchtilabil.

In der [Atmosphäre](#) bei 1500 m Höhen strömt die [Luft](#) reibungsfrei und die Temperatur wird durch die Luftströmung bestimmt. Die herangeführte Lufttemperatur hängt von dem letzten Ort ab, wo die Schichtung hochreichend labil war. Wenn wärmere [Luft](#) vom Boden über die Grundsicht hinweg in die freie [Atmosphäre](#) aufsteigt konnte und dies dort erwärmt ist. Warme [Luft](#), die uns oberhalb der Grundsicht im Winter aus Südwesten erreicht, wurde häufig im warmen südlichen Nordatlantik erzeugt. Die [Luft](#) in der freien [Atmosphäre](#) ist niemals trockenlabil,, häufig feuchtilabil oder stabil geschichtet.

Bei relativ zur Wassertemperatur bzw. zur Sonneneinstrahlung über Land wenn uns kalte [Luft](#) erreicht, ist die [Luft](#) innerhalb der Grundsicht (in der Höhen gesehen) wärmer als die [Luft](#) der freien [Atmosphäre](#), dies bedeutet, daß [Luft](#) von der Grundsicht in die freie [Atmosphäre](#) aufsteigt, es gibt also hochreichende [Labilität](#).

Kommt zu uns bei der Wassertemperatur bzw. Sonneneinstrahlung über Land warme [Luft](#), so ist die [Luft](#) in der freien [Atmosphäre](#) (in der Höhe) wärmer als die Grundsicht, dies hat zur Folge, daß es in der Grenze zwischen Grundsicht und freie [Atmosphäre](#) in 1000 bis 1500 m, selten bei 2000 m Höhe eine Temperaturabnahme oder eine Zone mit gleicher Temperatur mit der Höhe gibt, [Inversion](#) oder [Isothermie](#) genannt. Eine solche Schicht ist sowohl trocken als auch feucht, es kann also keine [Luft](#) von der Grundsicht nach oben gelangen.

Die [Inversion](#) wird Grundsichtinversion genannt. Ist die [Luft](#) innerhalb der Grundsicht in geringen Höhen feuchtilabil (Meeresluft) sammelt sich die feuchte der entstehenden nicht hochreichenden [Quellwolken](#) (in der Grundsicht) unter der Grundsichtinversion an und es bilden sich z.T. geschlossene [Schichtwolken](#) ([Stratocumulus](#)) mit der Basis von 1000 bis 1500 m Höhe.

Ist die [Luft](#) oberhalb der Grundsichtinversion feuchtilabil, kann es zu hochreichende Schauer- und Gewitterwolken kommen, sofern die Grundsicht nicht kühler als die [Luft](#) in der freien [Atmosphäre](#) ist, von potentieller Labilität. Das ist eine Grundsichtinversion (Deckel). Hier wird das Gewitterpotential vom Boden abgeschlossen durch einen Deckel darunter.